

| がん種 | レジメン名 | 薬剤 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与間隔 |
|------|--------------------|---------|-------------|------|------|------|
| 肝細胞癌 | デュルバルマブ +トレメリマブ | トレメリマブ | 300mg/body | day1 | 点滴静注 | 28日間 |
| | | デュルバルマブ | 1500mg/body | day1 | 点滴静注 | |

| がん種 | レジメン名 | 薬剤 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与間隔 |
|------|---------|---------|-------------|------|------|------|
| 肝細胞癌 | デュルバルマブ | デュルバルマブ | 1500mg/body | day1 | 点滴静注 | 28日間 |

| がん種 | レジメン名 | 薬剤 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与間隔 |
|------|--------------------|---------|-------------|------|------|------|
| 肝細胞癌 | アテゾリズマブ +ペバシズマブ | アテゾリズマブ | 1200mg/body | day1 | 点滴静注 | 21日間 |
| | | ペバシズマブ | 15mg/kg | day1 | 点滴静注 | |

| がん種 | レジメン名 | 薬剤 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与間隔 |
|-----|-------|--------|-----------------------|-----------|------|------|
| 胆道癌 | GEM | ゲムシタピン | 1000mg/m ² | day1,8,15 | 点滴静注 | 28日間 |

| がん種 | レジメン名 | 薬剤 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与間隔 |
|-----|----------|--------|-----------------------|--------|------|------|
| 胆道癌 | GEM+CDDP | シスプラチン | 25mg/m ² | day1,8 | 点滴静注 | 21日間 |
| | | ゲムシタピン | 1000mg/m ² | day1,8 | 点滴静注 | |

| がん種 | レジメン名 | 薬剤 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与間隔 |
|-----|-----------------|--------|------------------------|------------------|------|------|
| 膵臓癌 | GEM+S-1 (術前) | ゲムシタピン | 1000mg/m ² | day1,8 | 点滴静注 | 21日間 |
| | | S-1 | 80mg/m ² /日 | day1(夕)-day15(朝) | 内服 | |

| がん種 | レジメン名 | 薬剤 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与間隔 |
|-----|-------------|-----------|-----------------------|-----------|------|------|
| 膵臓癌 | GEM+nab-PTX | ナブパクリタキセル | 125mg/m ² | day1,8,15 | 点滴静注 | 28日間 |
| | | ゲムシタピン | 1000mg/m ² | day1,8,15 | 点滴静注 | |

| がん種 | レジメン名 | 薬剤 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与間隔 |
|-----|-------------|----------|-----------------------|--------|------|------|
| 膵臓癌 | mFOLFIRINOX | オキサリプラチン | 85mg/m ² | day1 | 点滴静注 | 14日間 |
| | | レボホリナート | 200mg/m ² | day1 | 点滴静注 | |
| | | イリノテカン | 150mg/m ² | day1 | 点滴静注 | |
| | | 5-FU | 2400mg/m ² | day1-2 | 点滴静注 | |

| がん種 | レジメン名 | 薬剤 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与間隔 |
|-----|-----------------|---------|-----------------------|------------------------|------|------|
| 膵臓癌 | nal-IRI+5-FU/LV | イリノテカン | 70mg/m ² | day1 | 点滴静注 | 14日間 |
| | | レボホリナート | 200mg/m ² | day1 | 点滴静注 | |
| | | 5-FU | 2400mg/m ² | day1-2 (インフューザ-ポンプ) | 点滴静注 | |

| がん種 | レジメン名 | 薬剤 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与間隔 |
|-----|-------|--------|-----------------------|-----------|------|------|
| 膵臓癌 | GEM | ゲムシタピン | 1000mg/m ² | day1,8,15 | 点滴静注 | 28日間 |

| がん種 | レジメン名 | 薬剤 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与間隔 |
|-----|------------|--------|-----------------------|-----------|------|------|
| 膵臓癌 | GEM+エルロチニブ | ゲムシタピン | 1000mg/m ² | day1,8,15 | 点滴静注 | 28日間 |
| | | エルロチニブ | 100mg/日 | 連日 | 内服 | |